

BIOPOLE INFOS

n°12 – Novembre 2017



LES MALADIES INFANTILES (ORL ET CUTANÉES): MODE DE CONTAMINATION, ÉVICTION SCOLAIRE ET RECOMMANDATIONS

Les maladies infantiles (ORL et cutanées) : mode de contamination, éviction et recommandations

	Maladie	Origine infectieuse	Contamination	Eviction	Recommandations
Sphère ORL	Otite	Virale ou bactérienne	Par l'air	Non*	Mesures d'hygiène
	Oreillons	Virale	Par l'air	Oui, 9 jours après le début de la parotidite	Vaccination, surtout les sujets contacts non vaccinés
	Rhinopharyngite, Laryngite	Virale	Par l'air	Non*	Mesures d'hygiène
	Bronchiolite, bronchite	Virale	Par l'air	Non*	Mesures d'hygiène
	Angine	Virale (90% des cas), bactérienne	Par l'air	Non*	Mesures d'hygiène
	Angine à streptocoque A ou scarlatine	Bactérienne	Par l'air	Oui, 2 jours après le début du traitement	Mesures d'hygiène
	Conjonctivite	Bactérienne, ou virale	Par contact direct avec l'œil ou indirect	Non*	Renforcement des mesures d'hygiène
	Coqueluche	Bactérienne	Par l'air	Oui, 3 jours après le début du traitement par Azithromycine ou 5 jours si Amoxicilline	Vaccination, chimioprophylaxie des sujets contacts
	Diphthérie	Bactérienne	Par l'air	Oui, jusqu'à 2 prélèvements négatifs à 24h d'intervalle	Vaccination, chimioprophylaxie des sujets contacts
	Grippe	Virale	Par l'air	Non*	Vaccination du sujet à risque
	Tuberculose	Bactérienne	Par l'air	Oui tant que le sujet est porteur de la bactérie	Vaccination, dépistage chez les sujets proches
Cutanée	Roséole	Virale	Par l'air	Non*	
	Varicelle	Virale	Par l'air	Non*	Mesures d'hygiène
	Rougeole	Virale	Par l'air	Oui, pendant 5 jours après le début de l'éruption	Vaccination, surtout les sujets contacts non vaccinés
	Impétigo	Bactérienne	Par contact direct des lésions	Oui et jusqu'à la guérison si traitement local seul, ou 48 heures après le début d'une antibiothérapie générale	Renforcement des mesures d'hygiène
	Gale	Parasite (sarcopte)	Par contact direct de la peau	Oui, 3 jours après le traitement	Traitement de l'environnement, renforcement des mesures d'hygiène
	Teignes	Champignon microscopique	Par contact direct du cuir chevelu ou indirect	Oui jusqu'à l'absence du champignon	Renforcement des mesures d'hygiène, dépistage chez les sujets proches

* La fréquentation de la collectivité durant la phase aiguë n'est pas souhaitable.

Source:
MEDQUAL
Avril 2017